

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Grandes cultures semences

2 - 15 février 1988


SPECIAL COLZA

(en collaboration avec les SUAD du Gard et de l'Hérault
et les Sociétés Coopératives Agricoles SUD-CEREALES et de BARJAC)

CHARANCON DE LA TIGE

- DEBUT DES CAPTURES
- RENFORCER LA SURVEILLANCE

Avec les conditions climatiques douces de l'hiver, le charançon de la tige arrive avec 4 semaines d'avance par rapport à l'habitude. Les premiers piégeages ont été effectués dans les secteurs d'Uzès et de Barjac et les colzas les plus avancés atteignent le stade sensible C1.



Stade C1

longueur 3-4 mm
pattes entièrement
noires



SURVEILLEZ vos cultures et réalisez un traitement dès que :

- les captures sont supérieures à 10 par jour (ou 40 à 50 pendant 4 à 5 jours)
- ou que vous observez une piqûre (= 1 ponte) par tige en moyenne sur 50 plants.

SPECIALITES à utiliser plus particulièrement en secteurs sensibles si le réchauffement se maintient : voir la fiche jointe au bulletin n°1 du 28 septembre 1987.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Un prochain avis fera le point de la situation.

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42

